

Lesák rumělkový/Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

Status: Zranitelný druh + předmět ochrany soustavy Natura 2000



Foto: David Hauck

Lesák rumělkový je nepřehlédnutelný. Díky svému sytě červenému zbarvení a extrémně plochému tělu vypadá jako malý drahokam ukrytý pod kůrou. Je to jeden z nejznámějších „evropsky významných druhů“, na které se v ochraně přírody soustředí velká pozornost.

Jak ho poznáte?

Jeho tělo je dokonalým evolučním nástrojem. Je tak tenké, že mu umožňuje volný pohyb v úzkých štěrbinách mezi kůrou a dřevem. Tam tráví většinu svého života – dospělci se líhnou na podzim, pod kůrou bezpečně prezimují a na jaře začínají být aktivní.


Život pod kůrou

Na rozdíl od některých svých vyběravějších kolegů je lesák rumělkový docela přizpůsobivý:

- **Pod kůrou (zase):** Najdete ho pod kůrou padlých i stojících kmenů, ale i na silnějších větvích.
- **Oblíbené stromy:** Miluje vlhčí dřevo se snadno se odlupující kůrou, nejčastěji na topolech, vrbách a dalších listnácích.

Kde ho najdeme?

Příběh lesáka je plný naděje. Ještě v 80. letech byl v Česku extrémně vzácný a hrozilo mu vyhynutí. Od 90. let se však začal šířit podél velkých řek a dnes osidluje nová a nová území. Potkat ho můžete v lužních lesích u řek, v zámeckých parcích, ale stále častěji i ve vyšších polohách. Na Šumavě na něj ještě čekáme, ale je to jen otázka času. Přestože se mu nyní daří lépe, v mnoha částech Evropy stále vymírá – naše populace jsou proto klíčové pro jeho celoevropské přežití.



Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

Rote Liste Bayern (2003): extrem selten (R)

Geschützt nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

Der Scharlachkäfer ist ein saproxyler (totholzbewohnender) Käfer mit auffällig roter Färbung. Mit seinem flachen Körper ist er hervorragend an das Leben unter der Rinde angepasst. Er besiedelt verschiedene Lebensräume. Man findet ihn in urwaldähnlichen Wäldern vom Tiefland bis in höhere Lagen, aber auch in gewöhnlichen Laubwäldern und intensiv bewirtschafteten Pappelmonokulturen. Besonders häufig ist er in gewässernahen Wäldern bzw. Auwäldern anzutreffen. Larven und Käfer leben unter der Rinde umgestürzter und stehender Stämme sowie unter der Rinde toter oder teilweise abgestorbener Bäume (meist Pappeln, Weiden und andere Laubbäume mit weichem Holz). Er bevorzugt Holz mit größerem Durchmesser, kann aber auch an relativ dünnen Stämmen vorkommen. Wichtig dabei ist, dass die Bäume feuchte und morsche Rindenbereiche aufweisen, jedoch sollte die Rinde dennoch relativ fest am Stamm sitzen. Die Käfer schlüpfen im Spätsommer und Frühherbst. Nach der Überwinterung unter der Rinde beginnt der Hauptaktivitätszeitraum im Frühjahr. Allerdings können die Käfer bis in den Juli hinein angetroffen werden.

Trotz ihres Schutzstatus breitet sich die Art derzeit deutlich aus und besiedelt rasch neue Lebensräume, insbesondere in Mitteleuropa. Die Populationen steigen beispielsweise in Bayern, Tschechien und Ungarn stark an, sodass der Käfer dort mittlerweile relativ häufig ist. An den Rändern ihres Verbreitungsgebiets (im Norden und Süden) gilt der Scharlachkäfer jedoch weiterhin als seltene, stark rückläufige oder gar ausgestorbene Art. In Tschechien waren lange Zeit nur wenige Fundorte bekannt. Anfang der 1990er-Jahre begann sich die Art jedoch wieder auszubreiten, sodass die Zahl der Neufunde stark anstieg, insbesondere entlang großer Flüsse. Heute ist sie auch in höheren Lagen anzutreffen und kommt in fast ganz Mähren und in einem großen Teil Böhmens vor.