

Bavorsko – Česko

Roháček jedlový/Rindenschröter (*Ceruchus chrysomelinus*)

Status: Ohrožený druh



Foto: Daniel Rydzi

Roháček jedlový je drobnější, ale o to vzácnější příbuzný známého roháče obecného. Jako takzvaný **pralesní relik**t je živoucím důkazem kontinuity našich horských lesů. Tam, kde se roháčkovi daří, víme, že les zůstal po staletí skutečným domovem divočiny.

Jak ho poznáte?

Tento leskle černý brouk dorůstá délky kolem **1,5 cm**. Na první pohled vás zaujmou jeho rýhované krovky a u samečků také nápadně široká hlava s mohutnými kusadly. Na rozdíl od

mnoha jiných vzácných brouků je aktivní ve dne, takže ho při troše štěstí můžete zahlédnout od dubna do srpna přímo na kmenech starých stromů.


Život pod kůrou

Roháček je velmi náročný na kvalitu svého domova. Vyhledává kmeny, které už mají něco za sebou:

- **Mokrý dřevo:** Larvy potřebují kmeny s vysokou vlhkostí, které jsou v pokročilém stádiu rozkladu.
- **Hnědá hniloba:** Vyvíjejí se 2 až 5 let ve dřevě napadeném specifickými houbami, které mění strukturu kmene na měkkou, trouchnivou hmotu.
- **Pestrost jídelníčku:** I když mu jméno přisoudilo jedli, nepohrdne ani smrkem, bukem nebo břízou – klíčové je, aby byl kmen dostatečně silný.

Kde ho najdeme?

Roháček jedlový je typickým „**deštníkovým druhem**“. Protože potřebuje velmi zachovalé a vlhké pralesovité prostředí, jeho ochranou automaticky zajišťujeme přežití stovkám dalších, méně nápadných obyvatel horských lesů. V České republice ho dnes najdeme prakticky jen v pohraničních horách, jako jsou Šumava, Beskydy nebo Jeseníky.



Rindenschröter (*Ceruchus chrysomelinus*)

Rote Liste Bayern (2003): stark gefährdet (2)

Der Rindenschröter (*Ceruchus chrysomelinus*), ein Vertreter der Familie der Lucanidae, ist eine seltene Käferart, die vor allem in urwaldartigen Waldbeständen in Mittelgebirgs- und Gebirgswälder vorkommt. Die Entwicklung der Larven dauert 2 bis 3 Jahre (maximal 5 Jahre) und findet in verrottenden Stämmen von Nadel- (Tanne, Fichte, Kiefer) oder Laubbäumen (Buche, Erle, Birke) statt. Diese sogenannte Urwaldreliktart bevorzugt Stämme mit hoher Feuchtigkeit und großen Durchmessern, die von Braunfäule befallen sind und sich in einem fortgeschrittenen Zersetzungsstadium befinden. Die Käfer erreichen eine Größe von etwa 1,5 cm und haben eine glänzende schwarze Farbe mit längsgerippten Flügeldecken. Männchen haben im Gegensatz zu den Weibchen einen breiteren Kopf mit massiven Mandibeln (Mundwerkzeuge). Die Käfer sind tagaktiv und kommen am häufigsten zwischen April und August auf der Oberfläche der Baumstämmen vor, in welchen sich ihre Larven entwickeln.

Das Vorkommen des Rindenschröters konzentriert sich in Tschechien hauptsächlich auf einen großen Teil des Gebirges entlang der Staatsgrenze (z. B. Böhmerwald, Beskiden, Jeseníky,

České Švýcarsko). Da es sich um einen leicht erkennbaren Vertreter des natürlichen Bergwaldes handelt, wird er oft als „Schirmart“ eingestuft, also als Lebewesen, dessen Schutz gleichzeitig andere Arten mit ähnlichen Lebensraumansprüchen fördert.