

Bavorsko – Česko

Tesařík javorový/Ungarischer Ahornbock (*Ropalopus ungaricus*)

Status: Ohrožený druh



Foto: Daniel Rydзі

Tesařík javorový je milovníkem slunce a javorů. Tento vzácný evropský unikát obývá prosvětlené okraje horských lesů, staré aleje nebo osamocené stromy na horských loukách. Na Šumavě představuje klíčového obyvatele horských listnatých porostů.

Jak ho poznáte?


Tesařík javorový je takzvaný **monofág** – je to vybíravý strážník, jehož larvy se u nás vyvíjejí výhradně ve dřevě javoru klenu. K životu nepotřebuje mrtvé dřevo na zemi, ale oslabené, sluncem prohráté kmeny nebo větve živých stromů. Je to nápadný brouk dorůstající délky až **2,5 cm**. Dospělce můžete potkat od května do srpna, jak se vyhřívají na kůře javorů nebo přeletují mezi soliterními stromy.

Život pod kůrou

- **Dva roky v utajení:** Larvy se vyvíjejí pod kůrou javorů, kde vytvářejí charakteristické chodbičky (požerky).
- **Strom jako domov:** Preferuje stromy, které jsou pravidelně poškozované (např. ořezem nebo mrazem), což mu usnadňuje cestu do dřeva.
- **Solitary:** Jeho přítomnost nám potvrzuje kvalitu „světlého lesa“. Ukazuje nám, že pro pestrou přírodu potřebujeme nejen husté hvozdy, ale i volně rostoucí stromy v krajině a prosvětlené lesní lemy.

Kde ho najdeme?

Jeho domovem jsou výšky mezi 600 a 1200 metry nad mořem. Zatímco na Moravě (v Jeseníkách a Beskydech) je o něco známější, v Čechách ho najdete **pouze na Šumavě**. To z šumavských javorových skupin dělá naprosto unikátní útočiště pro tento druh.



Ungarischer Ahornbock (*Ropalopus ungaricus*)

Rote Liste Bayern 2003: stark gefährdet (2)

Der Ungarische Ahornbock, ein Mitglied der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae), ist eine sehr seltene Käferart, deren Vorkommen auf Berg- und Mittelgebirgswälder beschränkt ist. Man findet ihn hauptsächlich an Waldrändern, in Alleen, an Bäumen auf Waldwiesen oder entlang der Waldgrenze. Ideale Lebensräume sind nach der Holzernte verbliebene Einzelbäume oder regelmäßig beschädigte (beschnittene) Bäume. Der Ungarische Ahornbock gilt als monophage Art, d. h. als eine Art, deren Larven sich ausschließlich im Holz von Ahornbäumen, in unserem Fall des Bergahorns (*Acer pseudoplatanus*), entwickeln. Obwohl detaillierte Informationen über seine Umweltansprüche noch nicht vollständig bekannt sind, zeigen Beobachtungen, dass die Larven sonnenbeschienene Stämme oder Äste teilweise geschwächter Bäume verschiedenster Größenklassen bevorzugen. Unter der Rinde legen die Larven charakteristische Fraßgänge an, in denen sie sich meist nach zwei Jahren verpuppen. Die Käfer erreichen eine Größe von bis zu 2,5 cm und sind von Mai bis August aktiv.

Der Ungarische Ahornbock kommt nur in Europa vor. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Mittel-, Ost- und Südeuropa, wobei mehrere Unterarten bekannt sind. In Tschechien

kommt die Art in Höhenlagen zwischen 600 und 1200 m über dem Meeresspiegel vor, wobei ihr Hauptverbreitungsgebiet das Hrubý Jeseník und die Mährisch-Schlesischen Beskiden sind. In Böhmen beschränkt sich die Art auf die Region Šumava, deren geeignete Laubbaum-Bestände für ihre Entwicklung entscheidend sind und auch für ökologisch ähnliche Arten eine zentrale Rolle spielen.